

Causa infrecuente de cojera en un lactante.

INTRODUCCION:

La cojera en los niños es una patología muy frecuente que requiere de un diagnostico diferencial preciso para poder proporcionar un tratamiento adecuado que evite complicaciones en el futuro.

La enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de vasos de pequeño y mediano calibre, que afecta principalmente a niños menores de 5 años. El cuadro clínico se caracteriza por presentar fiebre, afectación mucocutánea, adenopatías y descamación de los dedos, pudiendo añadirse la afectación de pequeñas y grandes articulaciones.

OBJEIVO:

Describir una etiología muy infrecuente de cojera en la infancia.

MATERIAL Y METODOS:




Niña de 20 meses con cojera izquierda de 10 días de evolución sin mejora tras tratamiento con antiinflamatorios y fiebre de hasta 37,8°C. AP: Episodio gingivoestomatitis hacia 15 días con inflamación y rojeces en muñeca y mano izquierda, adenopatías cervicales.

Analítica: leucocitosis, aumento PCR y VSG. Hemocultivo negativo.

Radiografía cadera, ecografía de cadera y abdominal: sin alteraciones.

Gammagrafía: aumento actividad de pool vascular en cadera izquierda con normalidad en actividad ósea, sugiere sinovitis. Patrón de algodistrofia en pierna y pie izquierdo.

RNM: No derrame articular, leve edema psoas iliaco y recto anterior, posible miositis.



CONCLUSIONES

La enfermedad de Kawasaki es poco conocida, pero hay que tenerla en cuenta como posible etiología de la cojera en la infancia.