

# Espaciador subacromial como tratamiento alternativo en roturas masivas del manguito rotador: en búsqueda de la mejor indicación.

Lucía Lanuza Lagunilla, Ainhoa Isern De Val, Jose Luis Ávila Lafuente, Vanessa González Sastre, Patricia López Cuello.  
Hospital MAZ, Zaragoza.

## INTRODUCCIÓN

Actualmente sigue siendo controvertido el **valor terapéutico** del uso del **espaciador subacromial (ES)** como tratamiento alternativo para los desgarros masivos del manguito rotador (MR).

## OBJETIVOS

Esclarecer qué **perfil de paciente** con una rotura masiva del MR obtiene mejor resultado subjetivo tras la implantación del ES de hombro.



## MATERIAL Y MÉTODO

- ✓ Revisión retrospectiva (N=19 pacientes)
- ✓ Intervenidos en mismo centro, por mismo cirujano
- ✓ Abril 2015 a Septiembre 2017
- ✓ Iq: CAH ± reparación MR + ES



Entrevista telefónica 6 meses tras iqx:

Funcionalidad y dolor

- Muy satisfechos
- Satisfechos
- Insatisfechos
- Muy insatisfechos

Se analizaron las diferencias según: edad, reparación parcial asociada y sin ella, subescapular (SE) íntegro o lesionado, y origen común y laboral.

## RESULTADOS

Edad media: 56,6 años



	Función	Dolor
Edad (años)		
< 55 (8)	63,6%	54,4%
>55 (11)	37,5%	50%
Laboral		
Sí (12)	50%	58,3%
No (7)	57,1%	42,9%
Rep.parcial MR		
Sí (6)	33,3%	50%
No (13)	61,5%	53,8%
Rotura completa SE		
Sí (6)	50%	33,3%
No (13)	53,8%	61,5%

## CONCLUSIÓN

- ✓ Los **resultados no son buenos**: 50-60% satisfacción media.
- ✓ **No grandes diferencias** entre grupos **laboral y no laboral**.
- ✓ Aquellos con una **reparación parcial asociada**, obtienen **resultados subjetivos levemente peores**.
- ✓ La **integridad del SE** es **valorada positivamente**, sobretodo en relación al **dolor**.
- ✓ Según nuestros resultados **parece que la indicación correcta** del ES será un paciente:

