

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE TUMOR ÓSEO EN MUÑECA, A PROPÓSITO DE UN CASO.

Pulido Albertus F., Robles Molina J.J., Martín Ortega J.A.
Hospital La Inmaculada, Huércal-Overa (Almería)

Introducción:

Es importante el diagnóstico diferencial de tumores en muñeca y mano por la diversidad de patologías.

Objetivos:

Se presenta un caso de una imagen sugerente de una tumoración lítica en muñeca.



Material y metodología:

Paciente de 58 años de edad que acude a consulta por presentar desde hace unos 7 meses clínica inflamatoria articular de muñeca. No presenta antecedente traumático.

Se solicita radiografía y se aprecia una lesión lítica a nivel de estiloides cubital.

Ante la sospecha de lesión tumoral ósea se realizan pruebas complementarias :TAC y analítica general.

Resultados:

La TAC informa de lesión secundaria a artropatía/enfermedad por depósito tipo gota en estiloides cubital de muñeca.

La analítica general confirma hiperuricemia.

Se pauta tratamiento para la hiperuricemia y el paciente mejora clínicamente.

Conclusiones:

La TAC informa de lesión secundaria a artropatía/enfermedad por depósito tipo gota en estiloides cubital de muñeca.

La analítica general confirma hiperuricemia.

Se pauta tratamiento para la hiperuricemia y el paciente mejora clínicamente.

